



Ročník III

2016

## *Lomanský Nepravidelník*

**05 / 1. 5. 2016**

Letošní žabí sezona pokračovala snůškami ropuchy obecné. Jsme rádi, že žáby si tůně našly samy.





Snůšky ale nejsou tak velké, jako v minulých letech. To jsme ovšem žáby přenášeli také odjinud, letos jsou JENOM naše.



Houbaři, pozor!!! **Už začínají růst.** Bohužel nejsme takoví mykologové, abychom s jistotou řekli, zda je to druh smrže či ucháče. Zatímco smrže jsou všechny jedlé, ucháčem se lze i otrávit. Raději jsme je nechali na místě.





Vzhledem k popisům v atlasech hub si myslíme, že to bude spíš nejedlý ucháč. Krása, ale pro jistotu si počkáme na houby známé.

*Ucháč obecný je jarní houba, roste v dubnu až červnu. Klobouk je tmavě kaštanově hnědý, mozkovitě zprohýbaný, 3-10 cm v průměru. Třeň je bílý, někdy s červeným nebo hnědavým tónem, válcovitý, jamkatý až provazcovitý. Výtrusný prach je bílý. Vůně je jemně houbová, nevýrazná.*

*Smrže (Morchella) mají klobouk jamkatý, nikoliv mozkovitě zprohýbaný. U nás roste několik druhů a všechny jsou jedlé.*

***Přestože v otázce původu otrav není ani dnes zcela jasno, nelze v žádném případě doporučit ucháč obecný ke konzumaci a je nutné ho považovat za houbu jedovatou, s potenciálně smrtelnými následky.***

*Otrava se projevuje zpravidla 6-12 hodin po požití houby, zprvu trávicími obtížemi a zvracením, v těžkých případech pak zhruba od třetího dne následuje jaterní selhání manifestované žloutenkou až i jaterním komatem; otrava může být smrtelná!*

*V některých krajích je tato houba ovšem sbírána a pro svou lahodnou chuť připravována k jídlu, ba dokonce i prodávána na trzích, jak je tomu např. ve Finsku. V takových případech je však vždy nezbytně třeba řádné a dlouhé tepelné úpravy a spaření před další přípravou; voda slitá po spaření je rovněž jedovatá. Literatura však konzumaci této houby pro její nebezpečnost, jakož i pro nemožnost odstranit jed vařením docela, zásadně nedoporučuje.*

*J. Heponá - MiSFN*