



Ročník III

2016

Lomanský Nepravidelník

10 / 15.10. 2016 – PODZIM a ježci

Závoje mlhy nad krajinou a noty ptačích písní rozsypané do všech důlků jako kuličky hazardního hráče.



V našem NaPaLo a u tůní je vše stejné jako v minulých letech. Nechceme se tedy opakovat podobnými snímky, raději se zamyslíme nad jedním problémem, který se opakuje rok co rok, a to je předčasné odnášení malých ježků do péče člověka. Jak to tedy s ježky je?

Obecně platí, že rozhodující je váha. Naše péče je nutná, pokud cca do 15. 10. je váha nižší než 200 g, do 30. 10. je váha nižší než 350 g a v listopadu je váha pod 550 g. Samozřejmě pokud je mládě zraněné či silně zamořené klíšťaty či vajíčky much. O ježka můžeme pečovat sami, lepší je předat ho některé záchranné stanici, nejlépe specializované na záchranu ježků. Většinou je nutné ježka zbavit klíšťat, blech a vnitřních cizopasníků (na komplikace způsobené parazity umírá většina ježků držených v lidské péči).

Ježci jsou hmyzožravci, jejich potrava se musí skládat z převážné části z masa. Podávat lze také konzervy a granule pro kočky, rozemleté vařené libové nesolené maso a vařené vajíčko. Tuto krmnou dávku můžeme doplnit hmyzem a jejich larvami. Zkrmujeme různé červíky, sarančata, cvrčky, šváby, larvy potemníka moučného, občas dát i piškoty. Jednou za měsíc se doporučuje ježkovi doplnit vápník. U mladých se to doporučuje jednou týdně.

Jako ubytování postačí kartonová krabice, tu vysteleme novinami či senem, které každý den měníme. Pokud je výběh nižší než 50centimetrů, přikrýváme jej, jinak je ježek schopen vylézt. Ježek musí být ubytován v teplotě okolo 19 stupňů Celsia. Pro ubytování je vhodný teplý sklep nebo jiné vytápěné prostory.

POZOR!!! Ježkovi nikdy nesmíme dát kravské mléko (mohli bychom mu s ním ublížit, protože jej nedovede strávit), ale vodu, což hodně lidí neví.

U nás žijí dva druhy ježků:

Ježek východní (*Erinaceus concolor*): má tmavou obličejovou část, bodliny jsou většinou nestejně uspořádány. Spodní část těla je šedá, kontrastní je bílá skvrna na hrudi. U starších jedinců je bílošedá, někdy zcela splyne s ostatní barvou srsti. Bodliny jsou světle až tmavošedé, stříbrošedé, nebo tzv. pepř a sůl. Tento druh mívá delší čumáček, také je neklidnější.

Ježek západní (*Erinaceus europaeus*): má od čenichu k očím po stranách obličejové části tmavé podélné pruhy, které se světlým pruhem uprostřed hlavy tvoří písmeno V. Spodní část těla je světle hnědá, béžová. Bodliny jsou uhlazené a směřují jedním směrem. Zbarvení bodlin je světle hnědé, tmavohnědé, někdy narezlé. Čenich je tupější. Celkově je tento druh - až na zvláštní výjimky - klidnější.

Potíž je ale v tom, že oba ježci se občas kříží, a tak někde najdeme jedince se znaky obou druhů.

Ježek prospí asi čtyři pětiny dne. Nejčilejší bývá mezi devátou hodinou večerní a půlnocí a pak ještě kolem třetí hodiny ranní.

U tohoto ježka byla pomoc nezbytná: **Váha 270 g, délka 11,5 cm.**

Za hlavou měl ošklivou hlubokou ránu plnou hnisu, mušičích vajíček a červů.



Druhý den byla objevena další rána. Z obou celkem vyjmuto 44 červů a mnoho muších vajíček.



Rány se dobře hojily. Po týdnu:



Velké poděkování patří paní P. Č., která ježka našla, kontaktovala Záchranou stanici živočichů v Plzni a následně pomohla s prvním ošetřením.



=====
Pro ježky je lepší vytvořit na zahradách u rodinných domů vhodné podmínky k přezimování, než je nosit do záchranných stanic. Dostačující je ponechat na zahradě hromadu listí, dřeva či alespoň kompostu, ve kterém si ježci sami najdou vhodné zimoviště. Existují dokonce speciální budky pro ježky, ale celkově úkrytů pro ježky na českých zahradách postupně ubývá a nahrazují je bazény a anglické trávniky. ☹

J. Hejrová - MiSFN

Kontakty na některé ZS:

ZÁPADNÍ ČECHY

Soos

tel.: 354 542 033

TOS – Tachov

tel.: 608 154 180

Rokycany

tel.: 371 722 686, 603 239 922

Plzeň

tel.: 777 145 960, 777 194 095

Spálené Poříčí

tel.: 371 594 842

SEVEROZÁPADNÍ ČECHY

Chomutov

tel.: 474 629 917

FALCO Litoměřice

tel: 606 280 121

STŘEDNÍ ČECHY

AVES Kladno

tel.: 602 336 014, 723 468 462

Praha-Jinonice

tel.: 602 205 070

Pátek

tel.: 603 864 822

Vlašim

tel.: 317 845 169, 777 800 460

Votice

tel.: 317 813 178, 603 259 902

JIŽNÍ ČECHY

Makov

tel.: 382 279 159, 724 090 220

Ohrada

tel.: 723 361 181, 387 002 211

SEVEROVÝCHODNÍ ČECHY

Libštát

tel.: 732 228 801

Jaroměř

tel.: 605 251 434, 603 847 189

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ

Pasíčka

tel.: 774 739 595

Vendolí

tel.: 604 830 851

Pavlov

Tel: 734 309 798, 569 721 293

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO

Stránské

tel.: 554 291 000, 777 256 577

STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ

MORAVA

Bartošovice

tel.: 556 758 675, 723 648 759

JIŽNÍ MORAVA

Brno

tel.: 602 524 228, 724 963 676

Němčice nad Hanou

tel.: 602 587 638

Buchlovice

tel.: 732 250 240

www.zachranazvirat.cz

Seznam záchranných stanic

- [Bartošovice](#)
- [Bublava](#)
- [Brno](#)
- [Buchlovice](#)
- [Hrachov u Sedlčan](#)
- [Chomutov](#)
- [Jaroměř](#)
- [Jinačovice \(ZOO Brno\)](#)
- [Kladno](#)
- [Kláštorec](#)
- [Liberec](#)
- [Libštát](#)
- [Dolní Týnec](#)
- [Makov](#)
- [Němčice](#)
- [Rozovy u Temelína](#)

- [Přerov](#)
- [Pasíčka](#)
- [Huslík u Poděbrad](#)
- [Pavlov](#)
- [Plzeň](#)
- [Praha](#)
- [Rajhrad](#)
- [Rokycany](#)
- [Soos](#)
- [Spálené Poříčí](#)
- [Stránské](#)
- [Tachov](#)
- [Třeboň](#)
- [Vendolí](#)
- [Vlašim](#)
- [Vrchlabí](#)



Mnoho mláďat lidskou pomoc nepotřebuje a z přírody je vzato díky lidské neznalosti přirozeného chování těchto zvířat. Lidé tak často ve snaze pomoci mláďatům vlastně uškodí.

Přestože se může zdát, že je mládě opuštěné, jeho rodiče jsou většinou nedaleko a pravidelně svého potomka krmí. U mnoha druhů volně žijících živočichů je běžné, že rodiče nechávají své potomky i několik hodin o samotě, když shánějí v okolí potravu. Mezi takovéto druhy patří například zajíci, srnky, kuny nebo ježci.

Mláďata zajíců se rodí už v březnu a některá dokonce i v únoru. Rodí se plně vyvinutá, vidí, slyší a mají zoubky. Samice je krmí pouze jednou denně. Mláďě zajíce prvních 10 dní nevydává pach, sedí na místě a nereaguje na okolí, což je pro něj nejlepší ochrana před predátory.

Také srnky nechávají svá mláďata prvních 7 – 10 dní po porodu o samotě a přicházejí je kojit pouze jednou za několik hodin.

Mláďata zpěvných ptáků (kosi, drozdi, sýkory apod.) po vylétnutí z hnízda neumějí létat a trvá jim několik dní, než se to naučí. Proto posedávají na zemi či v keřích, kde je jejich rodiče pravidelně krmí.

Tato mláďata zbytečně neodchytávejte! Když si nejste jistí, zda jsou osiřelá, zavolejte nejbližší záchranné stanici, kde vám poradí, jak se zachovat.

Kdy mládě potřebuje lidskou pomoc?

je-li zraněné nebo nemocné (krváčí, třese se, zvrací, má průjem, je apatické a nevšímá si okolí)

je-li podchlazené nebo promoklé

bylo-li napadeno psem či kočkou

je-li silně napadeno parazity

jsou-li v blízkosti mrtví rodiče či sourozenci

je-li v bezprostředním nebezpečí (auta, psi a kočky, malé děti, atd.)

je-li neopeřené ptáčí mládě (holátko) mimo hnízdo

je-li mládě nekrmového ptáka (kuře bažanta, koroptve nebo křepelky, kachně, house, mládě labutě) osamocené a nikde nejsou vidět jeho rodiče